



SPOT BİLGİLERLE Yeni Kuşak Parti İlaçları; Hallüsinojenler

Necmi BAYKAN

- Liserjik asit dietilamin (LSD)
- Psilosibin
- Meskalin
- Metilendioksimetamfetamin (MDMA, Ekstazi)
- Feksiklidin (PCP, Melek tozu)
- Esrar (Marihuana, kannabis, hint keneviri)
- Salvia divinorum
- Karakurbağası zehri veya yumurtası: bufotoksinler
- İpomoea türleri (çağçiçeği): liserjik asit amidi
- Muskat (hint cevizi): miristisin
- Datura türleri (şeytan elması ve boru çiçeği): skopolamin, atropin ve hyosiamin
- Ketamin
- Dekstrometorfan

LSD



- En güçlü psikoaktif bileşiklerden biri
- Kurutma kağıdı
- Etki başlangıcı 30dk, zirve 4saat, toplam etki 8-12 saat
- Sempatomimetik etkiler ardına halusinojenik etki
- Yönetimi

Psilosibin



- Kutsal mantar, sihirli mantar, shroom
- Yenmesinden yaklaşık 30 dakika sonra etki başlar, toplam etki süresi 4-6 saat
- Etki şekli ve gücü LSD' ye benzer

Meskalin

- LSD' den daha zayıf
- Kimyasal sentez zor
- Acı, GİS yan etki, birkaç saate etki başlar, 12 saate kadar sürer



MDMA



- Ekstazi, aşk ilacı, kulüp ilacı
- Etki 4-6 saat
- İdrar amfetamin tarama testleri
- İmmunolojik testler
- Psödoefedrin, deksroamfetamin, bupropion, ranitidin yanlış pozitif
- İlk 1 saatte gis dekontaminasyonu ve aktif kömür faydalı
- İntrakraniyal kanama, hipertansiyon, kardiyak aritmi, hipertermi, hiponatremi, nöbet gibi morbit ve mortal seyirli



Fensiklidin

- PCP, melek tozu
- Klasik halüsinojenlerden farklı olarak duyuşal farkındalıkta artma yerine duyu merkezinin bulanıklaşması
- Nistagmus, hipertansiyon, saldırgan davranış, ajitasyon
- Nöbet, rabdomiyoliz, miyoglobininüri, hipertermi



Marihuana

- Esrar , kenevir, kannabis
- Sersemlik, öfori, zaman/mekan çarpıklıkları, hafif taşıkardi, konjonktivada şişme, ortostatik hipotansiyon, zayıflamış motor koordinasyon





teşekkürler